

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ЮНИЭНЗИМ[®] с МПС

Регистрационный номер: П N012401/01

Торговое название: Юниэнзим[®] с МПС

Лекарственная форма: таблетки покрытые оболочкой

Состав:

Каждая таблетка покрытая оболочкой содержит:

Активные вещества:

грибковая диастаза (1:800) - 20,0 мг,
папаин (6000 ЕД/мг) - 30,0 мг,
симетикон - 50,0 мг,
активированный уголь - 75,0 мг,
никотинамид - 25,0 мг.

Вспомогательные вещества:

целлюлоза микрокристаллическая – 293,15 мг, лактоза – 50,0 мг, акации камедь – 15,0 мг, натрия бензоат – 0,10 мг, желатин – 10,0 мг, кремния диоксид коллоидный – 20,0 мг, тальк – 15,0 мг, магния стеарат – 5,0 мг, кармеллоза натрия – 20,0 мг.

Оболочка таблетки:

касторовое масло – 0,00044 мл, шеллак – 12,5 мг, кальция карбонат – 3,33 мг, уголь древесный – 0,833 мг, кремния диоксид коллоидный – 0,222 мг, сахароза – 90,555 мг, акации камедь – 6,666 мг, желатин – 1,666 мг, натрия бензоат – 0,080 мг, тальк – 23,333 мг, воск карнаубский – 0,075 мг, воск пчелиный – 0,075 мг.

Надпись на таблетках: титана диоксид.

Описание:

Черные, овальной формы, покрытые оболочкой таблетки с белой надписью “UNICHEM” на одной стороне. Допускается неоднородность окраски.

Фармакотерапевтическая группа: пищеварительное ферментное средство

Код АТХ: А09АА02

Фармакологические свойства

Папаин и грибковая диастаза являются пищеварительными ферментами, облегчающими пищеварение и усвоение в организме белков, жиров и углеводов.

Симетикон оказывает ветрогонное действие: затрудняет образование и способствует разрушению газовых пузырьков, облегчает выведение газов из кишечника, тем самым уменьшает вздутие живота, тошноту, а также боли и дискомфорт, вызванные метеоризмом.

Активированный уголь является адсорбентом. Поглощает газы и токсины, образующиеся при расстройстве пищеварения.

Никотинамид (витамин РР) оказывает регулирующее влияние на процессы пищеварения.

Показания к применению

Патологические состояния, сопровождающиеся нарушением внешнесекреторной функции поджелудочной железы: хронический панкреатит, панкреатэктомия, состояние после облучения (в составе комплексной терапии).

Метеоризм, в т.ч. в послеоперационном периоде.

Диспепсия, обусловленная непривычной пищей или перееданием.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый панкреатит, обострение хронического панкреатита, дети в возрасте до 3 лет.

Способы применения и дозы

Внутрь. По 1 таблетке 1-2 раза в сутки после еды.

Побочное действие

Аллергические реакции, покраснение кожи.

Особые указания

В периоды беременности и лактации препарат следует применять с осторожностью под контролем врача.

Форма выпуска

По 10 таблеток в стрип из алюминиевой фольги.

По 2 стрипа вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Или по 2 стрипа вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

По 5 пачек помещают в картонную коробку.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в сухом, защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель:

«Юником Лабораториз Лтд.», Индия.

Юником Бхаван, Прабхат Эстейт, С.В. Род, Джогешвари, Мумбай – 400 102.

Наименование и адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения на принятие претензий от потребителя

/Эксклюзивный дистрибьютор:

ЗАО «ТРАНСАТЛАНТИК ИНТЕРНЕЙШНЛ», Россия.

119590, Москва, ул. Улофа Пальме, д.1.

Тел.: 8 (495) 775-39-38; факс: 8 (495) 514-10-67/54.